



## Repérage et inclusion

- Auprès de chaque patient·e de sa propre patientèle
- Dans le cadre des soins habituels
- Au moins 1/an et aux moments opportuns

- **Encourager** les tentatives d'arrêt/réduction, **confirmer** le bénéfice associé
- Proposer des **aides et méthodes**, en particulier un **traitement nicotinique de substitution**
- Informer de la perspective d'un **rappel à 3 mois**

Options : différentes aides et méthodes recommandées, dont l'approche motivationnelle

## Intervention initiale

- T0 (à la suite du repérage)
- Face à face

**ACTION : Noter les éléments clés dans le dossier du/de la patient·e**

### EN CAS DE SUBSTITUTS NICOTINIQUES

- Identifier les signes de sur ou sous-dosage, adapter la posologie
- Informer de la perspective d'un rappel à 3 mois

- [1 semaine après une 1<sup>ère</sup> prescription]

**ACTION : Noter les éléments clés dans le dossier du/de la patient·e**

### ACTION

SI LE/LA PATIENT·E EST MAJEUR·E UNIQUEMENT  
Remplir le **questionnaire de suivi (de fin à M12)**

- Échanger sur l'**atteinte des objectifs fixés**, dans tous les cas **valoriser les efforts**
- Le cas échéant, **rassurer et reconnaître la difficulté** de modifier sa consommation (fréquence des rechutes, mais augmentation des chances de succès), identifier les **obstacles** rencontrés
- Adapter les **aides et méthodes** (le cas échéant, posologie du TNS)
- Informer de la perspective d'un **rappel à 3 mois**

## Intervention de suivi

- T0 + 3, 6, 9, 12 mois
- Par téléphone
- Au moins 2 tentatives (en laissant un message si possible)

**ACTION : Noter les éléments clés dans le dossier du/de la patient·e**