







Recommandations
lors de la prise en charge d'un patient "suspicion COVID-19"
à domicile
pour IDE et Médecins généralistes:






ATTENTION: Partir du principe que chaque patient peut-être porteur du virus (ou son entourage) et est susceptible de le transmettre au professionnel de santé. Dans la mesure du possible, tous les soins non urgents sont à reporter ou si possible réalisés par le patient lui-même ou son entourage. De même, dans la mesure du possible, privilégier la téléconsultation pour les médecins.

ATTENTION: Porter un masque chirurgical pendant toute la tournée. Celui-ci doit être changé si possible toutes les 4h, sauf s'il est souillé ou mouillé. Chez le patient COVID-19 avéré, le professionnel doit porter un masque FFP2 qu'il peut garder au maximum 8h. Si le soignant est amené à l'enlever pour une raison ou une autre, ce masque doit être changé.

ATTENTION: Avant de se rendre au domicile du patient, l'appeler pour faire aérer la pièce où se déroulera le soin ou la consultation. Lui demander de se laver les mains à l'eau et au savon. Si le patient est équipé, lui demander de vous accueillir avec un masque chirurgical ainsi que les autres membres de la famille.

<p>Arrivée au domicile: attention poignée de porte</p>		<p>Attention aux poignées de porte Ouvrir et fermer soi-même ou c'est le patient/l'entourage qui le fait</p>
<p>Poser son matériel (mallette, sacoche, autre,...)</p>		<p>Attention: éviter table/lit. Durée de vie sur les surfaces inertes</p> 

<p>Lavage des mains: SHA ou savon</p>		<p>Attention: si lavage de main savon, bien se sécher les mains avec un essui à usage unique de préférence</p>
<p>Tenue de protection: si possible blouse ou surblouse, surchaussures, gants et lunettes</p>		<p>Attention: si pas de surblouse ou de surchaussures, vêtements lavable à 60° et 2 paires de chaussures, une J1, l'autre J2. Privilégier cette tenue en cas de COVID avéré symptomatique</p>
<p>Donner un masque chirurgical au patient s'il n'en a pas</p>		<p>Lui expliquer comment bien l'ajuster. Comment le retirer. Bien se laver les mains avant et après.</p>
<p>Prêt pour le soin ou la consultation</p>		
<p>Désinfection du matériel à la fin du soin ou de la consultation</p>		<p>Produit détergent/désinfectant virucide.</p>
<p>Élimination des déchets</p>		<p>Double ensachement (mouchoirs, masques, gants) puis ordures ménagères. A stocker chez le patient jusqu'à la fin du confinement.</p> <p>DASRI filière habituelle</p>

Dossier patient		Si nécessaire pour les transmissions, le relevé de constantes, traitements, ordonnances... le stylo est celui du professionnel. Il doit être décontaminé également avant rangement.
Retrait de la tenue de protection		Attention , commencer par surchaussures et finir par les gants. Masque à retirer en ne touchant pas l'avant du masque, seulement la sangle derrière la tête.
Lavage des mains: SHA ou savon		
Désinfection du domicile du patient Rappel des mesures barrières		Demander au patient/entourage de désinfecter au max les surfaces touchées après le passage du soignant
Sortie du logement		Attention toujours veiller à ce que ce soit la même personne qui touche les poignées

<p>Fin de tournée: retour à domicile ou à la structure de soin</p>		<p>Décontaminer le volant et les surfaces dans votre véhicule. Si possible utiliser une house pour votre siège de voiture. Décontaminer les accessoires utilisés, le téléphone. Se re-laver les mains. Si possible changement de tenue, mise au lavage à 60 degrés, douche.</p>
--	---	---